

element[®] BORON

SK Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny PFC 1(C)(II)(b)

Zloženie:

4,5%	Celkového dusíka (N) 4,5% Amidického dusíka
10,5%	Bóru (B), ako etanol aminového komplexu, rozpustného vo vode
0,3%	Molybdénu (Mo), ako amónneho, rozpustného vo vode

Len na profesionálne účely! Číslo šarže/Dátum výroby: vid' na obale

CZ Vícesložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami – KfV 1(C)(II)(b)

Složení:

4,5%	Celkového dusíku (N) 4,5% Amidického dusíku
10,5%	Bor (B), jako ethanol aminového komplexu, vodorozpustný
0,3%	Molybden (Mo), jako amonného, vodorozpustný

Len pro profesionální účely! Číslo šarže/Datum výroby: viz na obalu

HU Több mikroelemet tartalmazó szervesetlen trágya – 1.C.II.b

Garantált tápanygtartalom tömegben:

4,5%	Összes nitrogén (N) 4,5% Amid-nitrogén
10,5%	Bór (B) etanol-amin komplex formájában, vízoldható
0,3%	Molibdén (Mo), mint ammónium, vízoldható

Csak szakmai célokra! Tételszám/Gyártás dátuma: lásd a csomagoláson



NUTRICON

ELICITOR[™]
patented technology

CE 101

Zložky:

CMC 1: Pôvodné látky a zmesi:

etanolamíno-boritý komplex (CAS č.: 68797-44-4)

Pokyny a dávkovanie:**Repka olejná:** 1-3l/ha na jeseň v štádiu 4 listu, na jar 1-3l/ha na začiatku predlžovania. 1l/ha v štádiu butonizácie. Dávka vody min. 200l/ha.**Slnečnica:** 1-2l/ha pred začiatkom tvorby pukov a 2-3l/ha v štádiu butonizácie. Dávka vody min. 200l/ha**Cukrová repa:** 1l/ha v štádiu 4-6 listu. Ďalšie 3 aplikácie v 2 týždňových intervaloch a v dávke 1l/ha. Dávka vody min. 200l/ha.**Obilniny:** 1-3 l/ha vo fáze odnožovania a po odnožovaní vo fáze intenzívneho rastu. Dávka vody min. 200l/ha.**Kukurica:** 2l/ha v štádiu 4-6 listov. Dávka vody min. 200l/ha.**Mák:** 1l/ha v štádiu 4-6 listov. Dávka vody min. 200l/ha.**Zemiaky:** 1-3l/ha v štádiu 6-8 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu po 10-14 dňoch. Dávka vody min. 200l/ha.**Drobné ovocie, jahody, vinič:** 2 aplikácie po 1-2l/ha. Prvá aplikácia pred začiatkom kvitnutia, druhá po 10-14 dňoch. Dávka vody min. 200l/ha.**Koreňová zelenina:** 1-2l/ha pri výške porastu 15 cm. Pri silnom nedostatku opakovať po 10-14 dňoch.**Ovocné stromy:** 1-2l/ha v 10-14 dňových intervaloch pred kvitnutím a v priebehu kvitnutia a vo fáze intenzívneho rastu. Dávka vody min. 200l/ha.**Použiť len v prípade skutočnej potreby.****Neprekročiť dávkovanie.****Informácie o bezpečnosti a životnom prostredí:****P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.**P270** Pri používaní výrobku nejezte, nepite ani nefajčite.**P280** Noste ochranné rukavice.**P301 + P312 PO POŽITÍ:** Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel. 02/54774166/ lekára.**P501** Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.**EUH210** Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.**EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**Podmienky skladovania:**

Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch, v suchých, vetrateľných skladoch pri teplotách 0 °C až + 30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a pred mrazom.

CZ element® BORON**Složky:**

CMC 1: Původní látky a směsi:

ethanolamin-boritý komplex (CAS č.: 68797-44-4)

Pokyny a dávkování:**Řepka olejná:** 1-3l/ha na podzim ve stádiu 4 listů, na jaře 1-3l/ha na začátku prodloužování. 1l/ha ve stadiu butonizace. Dávka vody min. 200l/ha.**Slunečnice:** 1-2l/ha před začátkem tvorby poupat a 2-3l/ha ve stadiu butonizace. Dávka vody min. 200l/ha.**Cukrová řepa:** 1l/ha ve stádiu 4-6 listů. Další 3 aplikace ve 2 týdenních intervalech a v dávce 1l/ha. Dávka vody min. 200l/ha.**Obiloviny:** 1-3 l/ha ve fázi odnožování a po odnožování ve fázi intenzivního růstu. Dávka vody min. 200l/ha.**Kukuřice:** 2l/ha ve stádiu 4-6 listů. Dávka vody min. 200l/ha.**Mák:** 1l/ha ve stádiu 4-6 listů. Dávka vody min. 200l/ha.**Brambory:** 1-3l/ha ve stádiu 6-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody min. 200l/ha.**Drobné ovoce, jahody, réva:** 2 aplikace po 1-2l/ha. První aplikace před začátkem kvetení, druhá po 10-14 dnech. Dávka vody min. 200l/ha.**Kořenová zelenina:** 1-2l/ha při výšce porostu 15 cm. Při silném nedostatku opakovat po 10-14 dnech.**Ovocné stromy:** 1-2l/ha v 10-14 denních intervalech před kvetením a během kvetení a ve fázi intenzivního růstu. Dávka vody min. 200l/ha.**Používat pouze v případě skutečné potřeby.****Nepřekračovat určené dávkování.****Informace o bezpečnosti a životním prostředí:****P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.**P270** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte.**P280** Používejte ochranné rukavice.**P301 + P312 PŘI POŽITÍ:** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. +420 224 919 293 / lékárna/...**P501** Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.**EUH210** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.**EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Doporučené podmínky skladování:

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, větratelných skladech při teplotách 0 °C až + 30 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem a před mrazem.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Ajánlott tárolási követelmények:

Tárolja a készítményt az eredeti, sértetlen csomagolásban, száraz, szellőző raktárakban, 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napfénytől és fagytól óvni kell.

HU **element® BORON** **Összetevők:**

1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek
etanol-amin-bór komplex (CAS szám: 68797-44-4)

Használati utasítás:

Repcé: 1-3l/ha ősszel 4 leveles állapotban, tavasszal 1-3l/ha a szárba indulás kezdetén. 1l/ha zöldbimbós állapotban. Vízádag min. 200 l/ha.

Napraforgó: 1-2l/ha rügyképződés előtt és 2-3l/ha a virágzás és a megtermékenyülés szakaszában. Vízádag min. 200 l/ha.

Cukorrépa: 1l/ha 4-6 leveles állapotban. További 3 kijuttatás 2 hetes időközönként és 1l/ha dózisban. Vízádag min. 200 l/ha.

Kalászosok: 1-3 l/ha a kelés fázisában és a szárba szökkenés után az intenzív növekedés fázisában. Vízádag min. 200 l/ha.

Kukorica: 2l/ha 4-6 leveles állapotban. Vízádag min. 200 l/ha.

Mák: 1l/ha 4-6 leveles állapotban. Vízádag min. 200 l/ha.

Burgonya: 1-3l/ha 6-8 leveles állapotban. Ha szükséges, 10-14 nap múlva ismételje meg az alkalmazást. Vízádag min. 200 l/ha.

Apró gyümölcsök, eper, szőlő: 2 kijuttatás 1-2 l/ha. Az első alkalmazás a virágzás kezdete előtt, a második 10-14 nap után. Vízádag min. 200 l/ha.

Gyökérszőldség: 1-2 l/ha 15 cm magasságban. Súlyos hiány esetén 10-14 nap múlva ismételje meg.

Gyümölcsfák: 1-2l/ha 10-14 napos időközönként virágzás előtt és virágzás közben és intenzív növekedés fázisában. Vízádag min. 200 l/ha.

Csak valós igény esetén használja.

Ne lépje túl az adagot.

Biztonsággal és környezettel kapcsolatos információk:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ **tel. +36 1 470 0129 /orvoshoz.**

P501 A tartalmat/edényt a veszélyeshulladék-gyűjtőhelyen kell leadni.

Výrobca / Výrobce / Gyártó:

NUTRICON s.r.o., Kúpeľná 596/2,

929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská republika

Telefón / Telefon: +421 905 397 571

E-mail / E-mail-cím: nutricon@nutricon.sk

Webová stránka / Honlap: www.nutricon.sk